

There are no translations available.

Jak rozpoznać tworzenie wtórnej panewki :

Organizm niemowlęcia potrzebuje tylko 2 tygodnie do wytworzenia wtórnej panewki, jest to mechanizm kompensacyjny organizmu niemowlęcia stworzony po to aby zatrzymać wysuwającą się głowę z pierwotnej panewki.

Powody są różne, najczęściej jest to zaburzenie czucia głębokiego, proprioceptywnego odpowiedzialnego za napięcie mięśniowe dociskające głowę do powierzchni stawowej. Receptory regulujące ten proces znajdują się w więzadle głowy i obrąbku stawowym

Pewne cechy mogą nam zasignalizować wytworzenie wtórnej panewki na przykład:

-płytko panewka proporcjonalnie do głowy lub drugiego stawu;

-głowa oddalona od panewki w gorszym typie;

-jeśli w trakcie badania widzimy dwa różne typy stawu (w tym zwichnięty co najmniej D) ,który da się poprawić to należy rozważyć powstanie wtórnej panewki ;

-asymetria w odwiedzeniu stawów która jest zauważana podczas przeprowadzania badania klinicznego i której nie da się skorygować;

-różny wygląd obu stawów ; asymetria w wypukłości pachwiny spowodowana przesunięciem głowy kości .

Badanie RTG jest rozstrzygające.



